



Resultados


Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 1ª aplicação de herbicidas no controle (%) de capim-amargoso (*Digitaria insularis*) resistente ao glifosato. Mandaguçu, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.




Estádio capim-amargoso: perfilhamento a pré-florescimento (9 plantas/m²)



Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 2ª aplicação de herbicidas no controle (%) de capim-amargoso (*Digitaria insularis*) resistente ao glifosato. Mandaguçu, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.




Estádio capim-amargoso: perfilhamento a pré-florescimento (9 plantas/m²)




Resultados

Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 3ª aplicação de herbicidas no controle (%) de capim-amargoso (*Digitaria insularis*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.




Estádio capim-amargoso: perfilhamento a pré-florescimento (9 plantas/m²)




Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 2ª aplicação de herbicidas no controle (%) de capim-amargoso (*Digitaria insularis*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.

Estádio capim-amargoso: perfilhamento a pré-florescimento (9 plantas/m²)




Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 3ª aplicação de herbicidas no controle (%) de capim-amargoso (*Digitaria insularis*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.

Estádio capim-amargoso: perfilhamento a pré-florescimento (9 plantas/m²)




Resultados


Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 1ª aplicação de herbicidas no controle (%) de buva (*Conyza sp.*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.



Estádio buva: >15 cm (25 plantas/m²)




Manejo pré-plantio da soja e os reflexos das 2 aplicações sequenciais de herbicidas no controle (%) de buva (*Conyza sp.*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.




Estádio buva: > 15 cm (25 plantas/m²)



Manejo pré-plantio da soja e os reflexos da 1ª aplicação de herbicidas no controle (%) de buva (*Conyza sp.*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.




Estádio buva: >15 cm (25 plantas/m²)




Resultados

Manejo pré-plantio da soja e os reflexos das 2 aplicações sequenciais de herbicidas no controle (%) de buva (*Conyza sp.*) resistente ao glifosato. Mandaguapé, PR. Fonte: CONPEA – Constantin et al., 2021.

Estádio buva: >15 cm (23 plantas/m²)



Influência da chuva (mm) após a aplicação na eficácia de controle (%) de corda-de-viola (*Ipomoea grandifolia*). Fonte: OFA Ceagro – Mattos et al., 2022.



Posicionamento técnico

Manejo de plantas daninhas resistentes em pré-plantio de soja



Manejo de plantas daninhas resistentes em pré-plantio de milho

