Um novo conceito no manejo de resistência focus 360°

O parceiro completo contra um inimigo complexo.

Teburaz®

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br

/ourofinoagrociencia

Teburaz®

Principais culturas:

milho soja café feijão

Teburaz é o fungicida sistêmico da Ourofino Agrociência que associa dois dos principais grupos químicos. É fundamental no manejo de doenças em milho, soja, café e feijão, destacando-se pelo amplo espectro de controle.

Manejo do complexo de manchas foliares na cultura do milho

Realizar, no máximo, duas aplicações por ciclo da cultura, com intervalo de 14 dias.
Iniciar as aplicações de forma preventiva entre 30 e 50 dias após o plantio.



Atributos

- **Composto por dois grupos químicos diferentes (manejo de resistência)**
- **Alta eficácia no complexo de doenças**
- **Alta compatibilidade com defensivos agrícolas**
- **Seletividade aos principais materiais plantados**
- **Ação preferencialmente preventiva**
- **Atua em diversas fases do alvo**
- **Flexibilidade de uso**

Benefícios

- Maior espectro de controle.
- Uso em multiculturas.
- Combinação com fungicidas multissítios e inseticidas.
- Não apresenta injúrias e sintomas de fitotoxicidade.
- Reduz a quantidade inicial de inóculos, diminuindo a taxa de progresso da doença.
- Recomendado em todas as épocas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fungicida dos grupos químicos das estrobilurinas e triazóis

- **Ingrediente ativo:** azoxistrobina + tebuconazol
- **Concentração:** 120 g/L e 200 g/L
- **Formulação:** suspensão concentrada (SC)

DOENÇAS CONTROLADAS E RECOMENDAÇÃO DE USO (L p.c/ha)

Cultura	Doenças	Doses e recomendações
Soja[1]	crestamento-foliar *(Cercospora kikuchii)*	0,5 Aplicar, no máximo, duas vezes a cada ciclo da cultura, considerando o período de florescimento (estádio fenológico R1 – R3), com intervalo de 14 dias. Se necessário, complementar com fungicida de outros grupos químicos.
	mancha-parda *(Septoria glycines)*	
Milho[1]	cercosporiose *(Cercospora zeae-maydis)*	0,5 Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 14 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente aos 30–50 dias após a semeadura.
	mancha-de-phaeosphaeria *(Phaeosphaeria maydis)*	
Feijão[1]	antracnose *(Colletotrichum lindemuthianum)*	0,6 Aplicar, no máximo, três vezes por ciclo da cultura, com intervalos de 14 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente, antes do aparecimento dos sintomas, a partir de R5-pré-floração (após emissão do primeiro botão), que ocorre entre 30–50 dias após a emergência.
	mancha-angular *(Phaeoisariopsis griseola)*	
Café[2]	ferrugem-do-cafeeiro *(Hemileia vastatrix)*	0,75 Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 30 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente em regiões com histórico da doença, antes do aparecimento dos primeiros sintomas. A área pulverizada deve ser monitorada.
	mancha-de-phoma *(Phoma costaricensis*	

1 – Aplicação terrestre: 200 L/ha | Aplicação aérea: 20 – 40 L/ha | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v
2 – Aplicação terrestre: 400 L/ha | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v

Para mais informações sobre alvos, doses e aplicações, consulte a bula do produto em **ourofinoagro.digital/teburaz**

V503 | 07/23

RESTRIÇÃO ESTADUAL: VERIFICAR BULA DO PRODUTO.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTO.

Ativo
Atendimento Integrado Ourofino

Nosso canal de atendimento ao cliente, fortalecendo a relação com o campo.

Fale com a gente:
0800 941 5508
(16) 99975-0892

ourofino agrociência

ourofinoagro.com.br
/ourofinoagrociencia