

# Teburaz<sup>®</sup>

Fungicida sistêmico com duplo mecanismo de ação e amplo espectro de controle.

O parceiro completo contra um inimigo complexo.



# Teburaz<sup>®</sup>



milho



soja



café



feijão

**Teburaz** é um **fungicida sistêmico** da Ourofino Agrociência que associa **dois dos principais grupos químicos**. É fundamental no **manejo de doenças em milho, soja, café e feijão**, destacando-se pelo **amplo espectro de controle**.




**Principais alvos:** cercosporiose, ferrugem-alaranjada, ferrugem-polisora, mancha-branca, mancha-parda, podridão-abacaxi, ramulária e ramulose.

Para informações sobre culturas, alvos, doses e uso, consulte sempre a bula do produto.



## Atributos e benefícios do Teburaz



### Composto por dois grupos químicos diferentes

Seu duplo modo de ação proporciona maior espectro de controle.



### Seletividade às principais culturas

Não causa injúrias e nem apresenta sintomas de fitotoxicidade, resultando em maior segurança para cultura e desenvolvimento das plantas.



### Alta eficácia no complexo de doenças

Controle superior sobre diferentes patógenos, garantindo maior sanidade para a lavoura.



### Ação preferencialmente preventiva, atua em diversas fases do alvo

Por atuar em diversas fases do alvo, reduz a população inicial de inóculos e desacelera o avanço da doença, protegendo a lavoura por mais tempo.



### Alta compatibilidade com defensivos agrícolas

Pode ser utilizado em associação com fungicidas multissítios e inseticidas, melhorando o desempenho.



### Flexibilidade de uso

Indicado para todas as fases da cultura.

# Informações Técnicas

Fungicida dos grupos químicos das estrobilurinas e triazóis

• **Ingrediente ativo:** azoxistrobina + tebuconazol


• **Concentração:** 120 g/L e 200 g/L

• **Formulação:** suspensão concentrada (SC)

## Manejo do complexo de manchas foliares na cultura do milho

Realizar, no máximo, duas aplicações por ciclo da cultura, com intervalo de 14 dias.


Iniciar as aplicações de forma preventiva entre 30 e 50 dias após o plantio.





# Teburaz<sup>®</sup>

Sugestão para uso do produto durante  
o período de infecção



## DOENÇAS CONTROLADAS E RECOMENDAÇÃO DE USO (L p.c/ha)

| Cultura             | Doenças                                                                                                          | Doses e Recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soja <sup>1</sup>   | Crestamento-foliar<br>( <i>Cercospora kikuchii</i> )<br>Mancha-parda<br>( <i>Septoria glycines</i> )             | 0,5<br>Aplicar, no máximo, duas vezes a cada ciclo da cultura, considerando o período de florescimento (estádio fenológico R1 – R3), com intervalo de 14 dias. Se necessário, complementar com fungicida de outros grupos químicos.                                                             |
| Milho <sup>1</sup>  | Cercosporiose<br>( <i>Cercospora zeae-maydis</i> )<br>Mancha-de-Phaeosphaeria<br>( <i>Phaeosphaeria maydis</i> ) | 0,5<br>Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 14 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente aos 30-50 dias após a semeadura.                                                                                                                   |
| Feijão <sup>1</sup> | Mancha-angular<br>( <i>Phaeoisariopsis griseola</i> )<br>Antracnose<br>( <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> )  | 0,6<br>Aplicar, no máximo, três vezes por ciclo da cultura, com intervalos de 14 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente, antes do aparecimento dos sintomas, a partir de R5-pré-floração (após emissão do primeiro botão), que ocorre entre 30-50 dias após a emergência. |
| Café <sup>2</sup>   | Ferrugem-do-cafeeiro<br>( <i>Hemileia vastatrix</i> )<br>Mancha-de-phoma<br>( <i>Phoma costaricensis</i> )       | 0,75<br>Aplicar, no máximo, duas vezes por ciclo da cultura, com intervalo de 30 dias. Recomenda-se que o trabalho seja feito preventivamente em regiões com histórico da doença, antes do aparecimento dos primeiros sintomas. A área pulverizada deve ser monitorada.                         |

1 – Aplicação terrestre: 200 L/ha | Aplicação aérea: 20 – 40 L/ha | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v  
2 – Aplicação terrestre: 400 L/ha | Adicionar adjuvante (O. Mineral): 0,5% v/v



RESTRIÇÃO ESTADUAL: VERIFICAR BULA DO PRODUTO.

**ATENÇÃO!**

PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE. LEIA E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS EM RÓTULOS, BULAS E RECEITAS. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS E O DE RESISTÊNCIA A DOENÇAS E PLANTAS DANINHAS. **CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO.**

DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E AS SOBRAS DE PRODUTO.

**Ativo**

Atendimento Integrado Ourofino

Nosso canal de atendimento ao cliente,  
fortalecendo a relação com o campo.

Fale com a gente:

☎ 0800 941 5508

💬 (16) 99975-0892